



ACR SUR TV OU FV AU BLOC OPÉRATOIRE

CONFIRMER

-  ou 
- Absence de pouls
- Effondrement capnie
- Noter l'heure: Hmin
- Designier le leader

INITIER

- RCP
 - ≥ 100 Compressions /min
 - 4-5 cm de profondeur
 - Relaxation complète
 - Rotation: toutes les 3 minutes

Appel à l'aide STOP Chirurgie

TRAITER

- Evaluer l'efficacité de la RCP
 - EtCO₂
 - Pression artérielle sanglante diastolique $> 20-40$ mmHg

- Défibrillateur 200 J biphasique : 1^{er} Choc

2^{ème} Choc

RCP 2min

3^{ème} Choc

RCP 2min

4^{ème} Choc

RCP 2min
Adrénaline 1mg + Cordarone 300mg IVD

- Renouveler Adrénaline 1mg/3min
- Renouveler Cordarone 150mg IVD + relais Cordarone 900mg/24h IVSE

VÉRIFIER

- FiO₂ = 1, haut débit de gaz frais
- Ventilation protectrice FR 10/min
- Accès veineux disponible

RECHERCHER CAUSES

- Respiratoires
- Cardiovasculaires
- Métaboliques
- Anesthésiques
- Neurologiques

Références:


ERC Guidelines 2015. <http://www.corguidelines.eu/>
Cardiac Arrest in the Operating Room. Janusz A.

[http://www.esahq.org/~media/ESA/Files/Refresher%20Courses/2012/Cardiac%20arrest%20in%20the%20operating%20room%20\(2012\).ashx](http://www.esahq.org/~media/ESA/Files/Refresher%20Courses/2012/Cardiac%20arrest%20in%20the%20operating%20room%20(2012).ashx)

Arrêt cardio-circulatoire au bloc opératoire. Lena-Quintard D. Le Praticien en anesthésie réanimation.2015;19:136-42.

Recommandations formalisées d'experts. Prise en charge de l'arrêt cardiaque. AFAR.2007;26:1008-1019.

Algorithme: ACR et rythme choquable



RECHERCHER CAUSES

- Respiratoires :
 - hypoxiques (inhalation, échec intubation, extubation accidentelle, pneumothorax, intubation sélective, panne de matériel, dépression respiratoire lors d'une ALR...)
 - Bronchospasme
- Cardiovasculaires :
 - Choc hypovolémique et/ou hémorragique
 - Manœuvres chirurgicales et diminution de la perfusion des organes
 - Embolie pulmonaire cruorique, gazeuse, grasseuse, de ciment
 - Augmentation de la pression intra abdominale
 - Accident transfusionnel
 - Choc anaphylactique (Faire impérativement les premiers prélèvements + + : histamine, tryptase, IgE anti-AQ)
 - Pneumothorax compressif
 - SCA (infarctus, Takotsubo...), tamponnade
 - HTAP sévère
 - Dysfonction d'un pace maker; Syndrome du Q-T long; BAV
 - Hypothermie
- Métaboliques :
 - hyperkaliémie CaCl 1g, Insuline 10UI dans G10% 500ml; hypoglycémie G30% 10ml; acidose, hyperventilation; hypocalcémie CaCl 1g
- Anesthésiques :
 - surdosage en agents anesthésiques, erreurs d'administration d'un médicament, anesthésie neuro-axiale avec bloc du tronc cérébral, intoxication aux anesthésiques locaux, hyperthermie maligne, choc anaphylactique
- Neurologiques :
 - accident vasculaire cérébral, hypertension intra crânienne